

Délai d'arrêt thérapeutique recommandé en cas d'exploration du SRAA



Médicament	Action	Délai d'arrêt du traitement avant l'exploration du SRAA
Spironolactone	Augmentation de la rénine	6 semaines
Oestrogènes	Augmentation de l'angiotensinogène	6 semaines
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion	Augmentation de la rénine et diminution de l'aldostérone	2 semaines
Diurétiques (autres que la spironolactone)	Augmentation de la rénine	3 semaines
Anti-inflammatoires non stéroïdiens	Diminution de la rénine	2 semaines
Inhibiteurs β -adrénergiques	Diminution de la rénine	2 semaines
Inhibiteurs des canaux calciques	Diminution de l'aldostérone	2 semaines

Classe médicamenteuse	Délai d'arrêt (semaines)
Spironolactone	6
Diurétiques autres que spironolactone	3
IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion)	2
ARA II (antagonistes du récepteur de l'angiotensine II)	2
bêta-bloquants	2
Aliskirène (inhibiteur direct de la rénine)	2

Pour plus d'informations : voir le site de Biomnis

<https://www.eurofins-biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/ALDOSTERONE.pdf>

<https://www.eurofins-biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/RENINE.pdf>