1er

Marron/Transparent : Tube sans additif → **PURGE**

! Tube de purge : si prélèvement avec **ailettes** → à utiliser obligatoirement AVANT tube citrate ou tube gris Quantiferon

2ème

Bleu : Citrate de sodium liquide → **PLASMA CITRATE**

! Un niveau de remplissage à 90% est impératif pour les tests d'hémostase (facteur de dilution)

3ème

Rouge : Tube sec avec activateur de coagulation

Rouille/Jaune : Tube sec avec activateur de coagulation + gel (3,5/5mL) → **SERUM**

4ème

Vert : Héparine de lithium (avec/sans gel) → **PLASMA HEPARINE**

Tubes Quantiféron© Cf GCS/C/C2/INS18

1. Tube à bouchon **gris** (contrôle NIL= Témoin négatif)
2. Tube à bouchon **vert** (TB1 ANTIGEN = Test)
3. Tube à bouchon **jaune** (TB2 ANTIGEN = Test)
4. Tube à bouchon **violet** (contrôle MITOGEN = Témoin positif)

5ème

Mauve : K2EDTA → **PLASMA EDTA dipotassique**

6ème

Gris : Fluorure de sodium (=antiglycolytique) + oxalate de potassium → **PLASMA FLUORE**

! Un niveau de remplissage à 90% est impératif (facteur d'évaporation)

…

Autres tubes

Règles à respecter

- Respecter l'**ordre** de prélèvement des tubes
- Veiller **au bon remplissage** des tubes (**! tube citrate, Quantiferon et Fluorure**)
- Bien **homogénéiser** les tubes dès le retrait du corps de prélèvement, par retournements lents
- **Ne jamais transvaser d'un tube à un autre**
- Coller l'étiquette d'identification du patient sur l'étiquette du tube de prélèvement (**! après vérification de l'identité**)
- Accompagner les tubes de la **feuille de demande d'analyse correctement remplie**
- Veiller à respecter les **conditions de prélèvement et de transport**

FICHE RECAPITULATIVE